

Version: EE 1.1 (2021.04.01修订)

内源性碱性磷酸酶封闭液 (20×)

目录号: EE0006

01/产品组分

序号	组分	EE0006
1	内源性碱性磷酸酶封闭液 (20×)	6 mL

02/保存条件

本产品于-20℃保存，有效期1年；2-8℃保存，有效期1个月。

03/产品概述

内源性碱性磷酸酶封闭液主要针对免疫组化染色、免疫细胞化学染色以及原位杂交试验过程中组织及细胞内源性碱性磷酸酶的封闭。本产品适用于培养的细胞、冰冻切片和石蜡切片。内源性碱性磷酸酶的存在会产生非特异着色。本产品有效成分为左旋咪唑，能够抑制除小牛肠碱性磷酸酶外的绝大多数其它类型的碱性磷酸酶。使用本产品能够明显降低内源性碱性磷酸酶造成的非特异性染色。

碱性磷酸酶染色液（即碱性磷酸酶底物溶液）应稀释 20 倍后使用。

04/注意事项

请务必在使用本试剂之前阅读此注意事项

- ◇ 该产品对内源性碱性磷酸酶的封闭作用是可逆的，与碱性磷酸酶染色液（即碱性磷酸酶底物溶液）配合使用。
- ◇ 操作时请穿实验服并戴一次性手套操作。
- ◇ 本产品仅用于科研实验。

05/使用方案

1. 将本产品用碱性磷酸酶染色液（即碱性磷酸酶底物溶液）按照1:20比例稀释，例如，取50 μL本产品加入到1 mL碱性磷酸酶染色液

（即碱性磷酸酶底物溶液）中，混匀后即可使用。

2. 配制好后按照碱性磷酸酶染色液（即碱性磷酸酶底物溶液）的使用方法使用。

06/相关产品

EE0007 内源性过氧化物酶封闭液

EE0008 山羊血清封闭液（原液）

EE0009 驴血清封闭液（原液）

EE0010 组化抗体稀释液

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: support@sparkjade.com

